


如何使用 Seretide[®] 使肺泰吸入器



1、拿開吸嘴蓋子。

2、為預防藥物顆粒沉澱，將吸入器上下搖晃均勻，使藥物充分混合。

3、接上塑膠延伸管。

4、使用吸入器前先慢慢深吐一口氣，口含住塑膠延伸管吸嘴，然後按壓吸入器藥瓶一下，並同時緩慢地吸飽一口氣。

5、吸氣完畢後移開吸入器，閉緊雙唇，接著閉氣 **5-10** 秒鐘，即可恢復呼吸。如醫師指示需吸入第二劑，請待呼吸平順後再重複動作一次。

6、本吸入劑含類固醇藥物，故使用後需**漱口**，防止口腔內念珠球菌感染。

注意事項

1、藥品正下方有劑量計數視窗 ，當計數視窗顯示「000」時，即是已無治療劑量，應停止使用。

2、可能的副作用：

口腔炎或出現白點、喉嚨痛、心悸、顫抖、、咳嗽、聲音嘶啞、瘀青。

編印單位: 胸腔內科
編印日期: 2020年9月22日第 三 版
全院編碼: 亞東醫院出版品 SH362
宗 旨: 持續提升醫療品質
善盡社會醫療責任
願 景: 成為民眾首選的醫學中心